

Teigne de l'olivier 12 juin 2016 2) (avis 2ème avis)



Le réseau de surveillance de l'INPV vient de signaler un début d'émergence de la 2^{ème} génération de la teigne de l'olivier dite carpophage (s'attaque aux jeunes fruits). A cet effet, les oléiculteurs dont les vergers ont déjà subi des attaques au stade boutons floraux (1^{ère} génération anthophage) et se trouvant au stade grossissement des fruits (0.5 à 1mm), doivent entamer immédiatement un traitement insecticide approprié afin d'éviter la chute prématurée des fruits.

De même, la vigilance doit être maintenue pour les autres oléiculteurs qui doivent se référer aux bulletins d'avertissements agricoles pour une éventuelle intervention.

Pour plus d'informations, veuillez vous rapprocher des services phytosanitaires régionaux.

نشهد حاليا بداية ظهور الجيل الثاني لفراشة الزيتون الذي يصيب الثمار. لهذا ننصح أصحاب أشجار الزيتون الذين سبق لهم وأن لاحظوا أضرار الإصابة بهذه الفراشة في مرحلة بداية الإزهار (الجيل الأول) والذين يتواجد عندهم الزيتون في طور تضخم الثمار (0.5-01 مم)، أن يبادوا فوراً بالمعالجة الكيميائية باستعمال مبيد حشري ملائم وهذا لتفادي السقوط المبكر للثمار.

وبالنسبة لباقي الفلاحين ، توخي الحذر مطلوب من أجل التدخل في الوقت المناسب وذلك بالإطلاع على التنبيهات الزراعية الصادرة عن المحطات الجهوية لحماية النباتات

للمزيد من المعلومات ، يرجى التقرب من مصالح حماية النباتات القريبة منكم .