



CARPOCAPSE DES POMMES ET DES POIRES 26/04/2017



Le réseau de surveillance de l'INPV a enregistré les premières captures d'adultes du carpocapse (1^{er} vol) correspondant au seuil de nuisibilité atteint au niveau des vergers de pommiers et de poiriers relevant des wilayas de Chlef et de Constantine.

Compte tenu du stade réceptif des variétés précoces du pommier et poirier (grossissement des fruits) aux piqûres des larves, associées à la présence de conditions climatiques propices à l'activité de ce papillon, **nous conseillons les arboriculteurs de procéder, dès à présent, à un premier traitement en appliquant un insecticide spécifique et homologué à cet usage.**

NB : Un deuxième traitement larvicide visant le stade baladeur du carpocapse, est à prévoir dès que les bulletins d'avertissement agricole le préconisent.



Pour plus d'informations, veuillez-vous rapprocher des services phytosanitaires régionaux

التنبهات الزراعية Avertissements agricoles

المعهد الوطني لوقاية النباتات
م. و.ع. 12 نهج الأخوة وادك حسن
ب.ادي - ص.ب. 80 الحراش - الجزائر



دودة التفاح والاجاص

2017/04/26



سجلت شبكة مراقبة دودة التفاح و الاجاص الخاصة بالمعهد اصطياد عدد من هذه الحشرات البالغة على مستوى بساتين ولايات الشلف و قسنطينة، موافق لعتبة التدخل.

ونظرا لتواجد الأصناف المبكرة للتفاح في طور قابل للإصابة بلسعات هذه اليرقات (تضخم الثمار) و توفر الظروف المناخية المساعدة، فإننا ننصح فلاحي هذه المناطق خاصة الذين سبق و أن تعرضت بساتينهم من قبل للإصابة بهذه الحشرة إلى إجراء العلاج الأول باستعمال مبيد حشري مخصص و مرخص لهذا الغرض.

ملاحظة : يرجى من الفلاحين برمجة معالجة ثانية تستهدف اليرقات عند خروجها و هذا بمجرد تلقي التنبهات الفلاحية المخصصة.



للمزيد من المعلومات، يرجى التقرب من مصالح حماية النباتات القريبة منكم.